

# 我国中小学生学习心理健康问题的研究进展\*

廖全明

( , 850000)

摘要

关键词

中图分类号: R84

文献标识码: A

LIAO Quan-ming

(Academic administration, Tibet University, Lhasa 850000, China)

This article reviewed the overall status quo of mental health problems in primary and junior high school students, happening rate of some mental problems and their mental health problems of different years, sex, grades and different degrees.

mental health problems; primary and junior high school students; epidemiology

中小学生学习正处在身心发展的关键期, 由于其生理上的成熟, 社会经验的不足, 因而容易受到不良刺激因素的影响。随着现代化进程的加快, 信息量的激增, 特别是由于生活节奏的加快、人际交往范围的拓展、学习压力的加大, 使中小学生学习逐渐成为各种心理健康问题的高发群体, 受到社会的广泛关注。本文试图对我国关于中小学生的心理健康问题的研究作一回顾, 包括不同年代、不同年级、不同性别及特定群体中小学生的心理健康状况, 为进一步研究提供依据。

## 目前我国中小学生学习心理健康的总体情况

我国有关中小学生学习心理健康问题的现状研究在 20 世纪 80 年代侧重于儿童行为问题的研究和心理疾病的介绍, 90 年代中期则既有心理健康问

题的现状调查也有影响因素的研究, 90 年代后期开始出现干预研究, 并同时从研究对象、研究方法、使用工具、统计方法等方面拓展深化现状研究。从目前各地调查结果来看, 我国中小学生学习心理健康状况不很乐观。尽管有研究者的理论观点、所使用研究工具、诊断标准及研究方法等原因造成研究结果的差异, 但对心理健康问题的检出率一般都在 10% ~ 30% 之间。如对北京市 2 万多名中学生跟踪调查显示有轻度心理问题的占 28.0%, 中度的占 3.9%, 重度的占 0.1%<sup>[1]</sup>; 中小学生学习心理素质建构与培养研究课题组对全国 16 472 名中小学生学习进行调查发现, 小学生有中度心理和行为问题的比例是 16.4%, 有严重心理问题的人数占 4.2%; 初中生有中度心理和行为问题的比例是 14.2%, 有严重心理问题的比例是 2.9%; 高中生有中度心理问题的比例是 14.8%, 有严重

\* 收稿日期: 2007-09-17

作者简介: 廖全明(1969-), 男, 四川营山人, 西南大学心理学院博士, 副教授, 主要研究人格心理学和应用心理学。

基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国心理健康服务体系现状及对策研究”(05JZD00031)

主持人: 黄希庭。



数研究都认为,随着年级的升高,学生的心理健康水平也逐渐下降。如高艳华、王敏(1995年)发现小学二年级、四年级、六年级学生和初一、初二、初三学生各种心理健康问题的检出率分别是14.36%、14.50%、15.82%、15.61%、15.52%、16.50%,而高中学生的心理健康状况要差于初中生<sup>[14]</sup>。小学生的心理健康状况总体良好,但随着年级的升高,学生的自我意识逐渐发展和分化,从小学生具体、绝对自我发展到初中生独立的自我,再到高中生抽象、复杂的自我,个体的现实自我和理想自我的矛盾也逐渐显现出来,当然也就较容易产生较多的心理问题。杨金辉等研究发现高中3个年级心理健康问题的检出率分别为18.32%、23.46%、29.71%,反映高三学生的心理健康状况显得较为突出<sup>[15]</sup>。从类别上看,小学生的心理健康问题主要表现为注意障碍、情绪障碍、违纪、行为问题、欺负行为等问题,初中生的心理健康问题主要表现为情感障碍、自我意识障碍、人际关系问题、学习困难等,而高中生的心理健康问题主要表现为学习问题、情感问题、人际关系障碍、自我评价问题等。

## 特殊群体中小学生学习心理健康状况

我国少数民族学生的心理健康状况不容乐观。李辉教授<sup>[16]</sup>对云南少数民族学生进行大规模调查发现严重心理健康问题者的检出率为6.4%,民族学生的心理健康水平不仅与内地及沿海学生有显著差异,也明显不及当地汉族学生,越是来自少、边、穷地区的民族学生,心理问题越为严重。其问题严重程度依次为人际敏感、强迫、偏执、忧郁、焦虑、恐怖、精神病性,其中人际敏感和强迫症状问题尤其突出。

内陆山区学生的心理健康状况较为良好,但也有值得关注的心理问题。廖全明调查后发现西部农村初中学生中有29.4%存在各种轻度不良心理反应,但仅有3.0%的学生存在明显的心理健康问题,并且要好于同期发达地区中学生的心理健康状况。但内陆山区学生的情感障碍、社会适应障碍、学习困难等问题仍表现较为突出<sup>[17]</sup>。

独生子女中小学生学习心理健康状况要略差于非独生子女。多数研究者都没有发现独生子女与非独生子女中小学生学习心理健康水平的明显差异,国内外研究表明相对于非独生子女来说,独生子女智力较好,聪明伶俐、思维活跃、才思敏捷、观察力强、注意力集中、记忆力强、活泼开朗、兴趣广泛、情感丰富、成就动机强。

年研究

子女人格发展课题组”研究发现10%以上的独生子女不愿意接纳自己的学习成绩、健康状况及自己的相貌形体;11.5%的独生子女不愿意别人比自己强,尤其熟悉的同学、朋友;9.2%的独生子女认为别人毫不重视自己<sup>[18]</sup>。总体上看独生子女中小学生学习除了可能产生一般中小学生学习容易产生的心理问题以外,还容易表现出娇气任性、自私、依赖、嫉妒、社会适应不良、偏食等突出心理问题。

农民工子女的心理健康状况较为严峻。随着社会经济的发展和城市化进程的加快,大量的农民工涌入城市,据估计我国拥有各类流动人口1.2亿,其学龄子女也是我国中小学生学习中的一个比较庞大的群体,其心理健康状况自然受到关注。对我国浙江地区外来农民工子女进行调查<sup>[19]</sup>发现,我国农民工子女的心理行为问题总检出率为36.02%,而本地学生心理问题的检出率仅为22.71%,以自卑、压抑、学习焦虑等情感问题最为突出,其中男生的行为问题多表现为多动、违纪、交往不良、攻击性、分裂样等,女生行为问题多表现为抑郁、社交退缩、体诉、分裂样、强迫性等。

残疾学生的心理健康状况依残疾情况而有不同的特点。聋哑学生的心理健康状况总体良好,对重庆市聋哑学生进行的调查<sup>[20]</sup>表明心理问题的总检出率为6.7%,有心理问题的检出率为22.8%,其中女生的心理问题较多、居住于城市的学生心理问题较多,主要表现为学习障碍、情感障碍、社会适应问题、躯体化障碍等问题;轻度智力落后学生的心理健康水平明显低于智力正常学生,随班就读的弱智学生要差于辅读学校弱智学生,表现的心理问题主要有学习焦虑、情感障碍、躯体化障碍、冲动行为等。

此外,农村留守儿童、宏志班学生、辍学中学生等群体的心理健康问题的发生率较高。

我国正处在社会转型时期,现代化程度在不断提高,使个体的心理行为问题有不断增加的趋势。学习压力的加大、家庭教养不当、社会支持资源的缺乏等外因,不良生活习惯、不健全的人格特征、消极的应对方式以及个体自我意识的发展水平等内因影响了我国中小学生学习心理健康问题的产生和发展。就现有的干预措施来看,治疗性干预对多动症、神经症及学习障碍等问题较为有效,但中小学生的心理健康问题多处于动态的变化过程中,能较好地通过自我潜能的挖掘而达到平衡,因此应更多地采取发展性干预措施。

## 参考文献

[1] 高一山. 调查显示三成中学生心理有问题[N]. 中国

- 青年报, 1999- 11- 22(4).
- [2] 沃建中, 马红中, 刘 军. 走向心理健康: 发展篇 [M]. 北京: 华文出版社, 2002: 9- 10.
- [3] 崔美玉, 刘惠善. 同辈咨询在中小学心理健康教育中应用的必要性[J]. 教育探索, 2005, 25(10): 100- 102.
- [4] 于守臣, 宋 彦. 1414名中学生心理健康状况调查[J]. 中国心理卫生杂志, 1994, 8(1): 7- 8.
- [5] 周卫华, 任传波. 15年儿童少年精神疾病诊断与治疗变迁[J]. 健康心理学杂志, 2000, 8(5): 547- 549.
- [6] 余 巍, 胡嘉红, 李 莉, 等. 广州市2~12岁儿童1734名睡眠障碍的流行病学调查[J]. 中国临床康复, 2005, 9(8): 92- 93.
- [7] 李淑然, 沈 渔, 张维熙, 等. 中国七个地区神经症流行病学调查[J]. 中国精神科杂志, 1998, 31(2): 80.
- [8] 谭 斌. 恩施市高中生抑郁症状初步调查[J]. 恩施医专学报, 1996, 13(2): 26- 27.
- [9] 江火田颐. 别拿忧郁不当病[N]. 天津日报, 2003- 04- 15.
- [10] 忻仁娥, 唐慧琴, 张志雄, 等. 全国22个省市26个单位24013名城市在校少年儿童行为问题调查——独生子女精神卫生问题的调查, 防治和Achenbach's儿童行为量表中国标准化[J]. 上海精神医学, 1992, 4(1): 47- 55.
- [11] 陶维娜, 徐相蕊, 王 冰, 等. 4~16岁儿童行为问题及其相关因素的调查研究[J]. 中国儿童保健杂志, 1996, 4(3): 20.
- [12] 胡胜利. 高中生心理健康水平及其影响因素的研究[J]. 心理学报, 1994, 26(2): 153- 160.
- [13] 于连政, 侯书文, 刘奇男, 等. 辽宁省中学生心理健康状况及其环境影响因素[J]. 中国学校卫生, 2007, 28(2): 38- 39.
- [14] 高艳华, 王 敏. 中小学生学习心理健康影响因素的研究[J]. 健康心理学, 1995, 3(4): 41- 43.
- [15] 杨金辉, 王学立, 彭正龙, 等. 淮南市1160名高中生心理健康状况[J]. 中国学校卫生, 2003, 24(3): 264- 265.
- [16] 李 辉, 张大均, 廖全明. 云南少数民族中小学生学习心理健康问题及对策研究[J]. 西南师范大学学报(人文社会科学版), 2004, 30(2): 38- 44.
- [17] 廖全明. 内陆山区初中生心理健康状况的研究[J]. 怀化学院学报, 2005, 24(2): 149- 151.
- [18] 饶淑园. 跨世纪人才心理素质探讨[J]. 惠州大学学报, 1998, 18(1): 68- 71.
- [19] 林 芝, 翁艳燕. 民工子弟学校初中生心理健康状况调查[J]. 中国心理卫生杂志, 2004, 18(2): 116.
- [20] 张宇迪, 陈呈超. 聋哑生心理健康状况的初步调查[J]. 中国特殊教育, 2006, 13(5): 28- 32.

( 51 ) 长久则会引起肥胖, 这是引起男生肥胖的主要原因。

不吃早餐使上午能量供给不足, 学习效率下降, 同时会消耗体内蛋白质作为能量代谢而白白浪费; 不吃早餐还能使人中午饥饿感加重, 会增加午餐饮食过量, 造成能量过剩而引起肥胖。所以不吃早餐既能引起营养不良, 又能引起肥胖。

(3) 一些女生追求身材苗条盲目节食: 在平日接诊中了解到一些女生为了身材苗条盲目节食, 中餐不吃饱, 晚餐不吃或以水果代替, 引起营养不良。

#### 对策建议

①首先要提高大学生营养健康意识, 让他们知道营养不良和营养过剩都是身体不健康的表现, 而且会对将来的身体健康造成隐患, 如长期营养不良可引起免疫功能低下、贫血、低血糖等, 长期肥胖可导致心血管疾病及糖尿病等。应提高大学生对自己营养健康负责的意识, 科学管理自己的饮食方式, 为紧张的大学学习生活打好基础。

②积极开展营养健康知识的教育。可利用健康教育宣传栏、广播、网络等方式进行健康知识的宣传, 使学生充分认识合理膳食、营养均

衡、食物多样化对身体健康的重要性。充分认识挑食偏食、不吃早餐、暴饮暴食对身体的危害。改掉不良饮食习惯, 提高自我约束能力, 树立健康就是美的观念, 反对盲目节食。正确的方法是合理控制饮食, 少吃高能量食物如肥肉、糖果、油炸食品。同时应增加体育活动, 使能量的摄入和消耗达到平衡。③加强食堂管理, 提高食堂饭菜的营养质量, 注意各种食物的营养搭配, 采取科学的烹调方式, 保证学生每天营养的供给。④加强整个社会对青少年营养知识的教育和良好饮食习惯的培养。特别是家长和幼儿园的老师在从小培养孩子各种知识和能力的同时也要注意对孩子进行营养知识的教育和良好饮食习惯的培养。

#### 参 考 文 献

- [1] 俊 峰, 侯培森. 当代健康教育与健康促进[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 234- 239, 427- 461.
- [2] 孙圣道, 景村仁等. 大学生健康教育[M]. 西安: 西安出版社, 2000: 93- 112.
- [3] 李丽娟, 张 永. 大学生营养状况调查[J]. 保健医学研究与实践杂志, 2007, 4(1): 47- 49.